

ADICCIÓN AL JUEGO

De acuerdo con el Manual diagnóstico y estadístico de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, 5ª edición, un diagnóstico de ludopatía o adicción al juego requiere al menos 4 de los siguientes síntomas en el último año:

- 1 Necesita jugar con mayores cantidades de dinero para lograr la emoción deseada.
- 2 Está inquieto o irritable cuando intenta jugar menos o dejar de jugar.
- 3 Ha realizado repetidos esfuerzos sin éxito para controlar, reducir o eliminar el impulso de jugar.
- 4 Frecuentemente está preocupado por el juego (p. ej., tiene pensamientos persistentes de revivir las experiencias posteriores al juego, prepara o planifica su próxima apuesta o piensa en formas de obtener dinero para jugar).
- 5 A menudo juega cuando se siente angustiado (p. ej., impotente, culpable, ansioso o deprimido).
- 6 Después de perder dinero jugando, frecuentemente regresa otro día para la revancha (recuperar las pérdidas).
- 7 Miente para ocultar la cantidad real que ha apostado.
- 8 Ha puesto en peligro o perdido una relación significativa, un trabajo o una oportunidad educativa o profesional debido al juego.
- 9 Tiene que pedirles a otras personas que le den dinero para resolver situaciones financieras desesperadas provocadas por el juego.

SI ESTÁ EXPERIMENTANDO ALGUNO DE ESTOS SÍNTOMAS, PUEDE ESTAR EN CAMINO A DESARROLLAR LUDOPATÍA O ADICCIÓN AL JUEGO.

VCPG mantiene una postura neutral sobre el juego.

Hay ayuda disponible:
888-532-3500
www.vcp9.net

